



Cristhian Fabricio Sancan Zambrano ^a; Nieve Geomara García Palacios ^b; María Angélica Mendoza Intriago ^c; Juan Carlos Saltos Zambrano ^d; Angélica María Tumbaco Tumbaco ^e; Dolly Natasha Ross Mera ^f

Prevención y cuidado de los recién nacidos durante el parto

Prevention and care of newborns during childbirth

Revista Científica de Investigación actualización del mundo de las Ciencias. Vol. 3 núm., 4, octubre: 2588-0748, 2019, pp. 399-411

DOI: [10.26820/reciamuc/3.\(4\).octubre.2019.399-411](https://doi.org/10.26820/reciamuc/3.(4).octubre.2019.399-411)

URL: <https://reciamuc.com/index.php/RECIAMUC/article/view/455>

Código UNESCO: 3205 Medicina Interna

Tipo de Investigación: Artículo de Revisión

© RECIAMUC; Editorial Saberes del Conocimiento, 2019

Recibido: 15/05/2019

Aceptado: 07/08/2019

Publicado: 01/10/2019

Correspondencia: edisonsantanab@hotmail.com

- a. Médico Cirujano; Médico Residente de Terapia Intensiva – Hospital General Napoleón Dávila – Chone; dr.sancan.95@gmail.com; Chone - Ecuador.
- b. Médico Cirujano; Hospital General Napoleón Dávila – Chone; geosa_810@hotmail.com; Chone - Ecuador.
- c. Médico Cirujano; Hospital General Napoleón Dávila – Chone; marangie_73@hotmail.com; Chone - Ecuador.
- d. Médico Cirujano; jkrlos1986@hotmail.com; Portoviejo - Ecuador.
- e. Médico Cirujano; Médico Residente de Emergencia - Hospital General Napoleón Dávila – Chone; angelica_amtt@hotmail.com; Chone - Ecuador.
- f. Médico Cirujano; Clínica del Sol; naty-ross@hotmail.com; Manta- Ecuador.

Prevención y cuidado de los recién nacidos durante el parto

Vol. 3, núm. 4., (2019)

Cristhian Fabricio Sancan Zambrano; Nieve Geomara García Palacios; María Angélica Mendoza Intriago; Juan Carlos Saltos Zambrano; Angélica María Tumbaco Tumbaco; Dolly Natasha Ross Mera

RESUMEN

El nacimiento de un niño es el acontecimiento más importante en la vida de una mujer y, en general, para el mundo ya que representa la reproducción de la especie humana. Tan especial acontecimiento, casi siempre, es un proceso espontáneo y sin complicaciones, no obstante, existen casos en donde algunas circunstancias pueden poner en riesgo la salud y la vida de la madre y del recién nacido. La presente investigación se enfoca en el tema de la prevención de complicaciones durante el parto y el cuidado del recién nacido en esta etapa. El diseño de investigación que se llevó a cabo es de tipo documental o bibliográfico. Los principales factores de riesgo de las complicaciones para el recién nacido en el momento del parto son la presión arterial alta de la madre, diabetes, VIH/SIDA, factores relacionados con la edad como la adolescencia y otros que guardan relación con su estilo de vida como la obesidad, el consumo de tabaco o alcohol. Existen otros factores asociados a la condición del embarazo como embarazo múltiple y diabetes gestacional. Con relación al cuidado del recién nacido en el parto la Organización Mundial de la Salud publicó una lista de 56 recomendaciones para los cuidados durante el parto, que garantizan el bienestar tanto de la madre como del recién nacido y que constituye la base para que los diferentes países del mundo actualicen sus guías o manuales a los fines de brindar la mejor atención de salud posible. Resulta imperioso garantizar el acceso a una atención médica digna a las mujeres embarazadas de todo el mundo y atacar el problema de salud de la morbilidad materna y neonatal.

Palabras Claves: Prevención, Cuidado, Recién, Nacido, Parto.

Prevención y cuidado de los recién nacidos durante el parto

Vol. 3, núm. 4., (2019)

Cristhian Fabricio Sancan Zambrano; Nieve Geomara García Palacios; María Angélica Mendoza Intriago; Juan Carlos Saltos Zambrano; Angélica María Tumbaco Tumbaco; Dolly Natasha Ross Mera

ABSTRACT

The birth of a child is the most important event in a woman's life and, in general, for the world as it represents the reproduction of the human species. Such a special event, almost always, is a spontaneous and uncomplicated process, however, there are cases where some circumstances may put the health and life of the mother and the newborn at risk. This research focuses on the issue of preventing complications during childbirth and caring for the newborn at this stage. The research design that was carried out is documentary or bibliographic. The main risk factors for complications for the newborn at the time of delivery are the mother's high blood pressure, diabetes, HIV / AIDS, age-related factors such as adolescence and others that are related to her lifestyle such as obesity, tobacco or alcohol consumption. There are other factors associated with the condition of pregnancy such as multiple pregnancy and gestational diabetes. Regarding the care of the newborn in childbirth, the World Health Organization published a list of 56 recommendations for the care during childbirth, which guarantee the well-being of both the mother and the newborn and that constitutes the basis for the different countries of the world update their guides or manuals in order to provide the best possible health care. It is imperative to guarantee access to decent medical care for pregnant women around the world and to attack the health problem of maternal and neonatal morbidity and mortality.

Key Words: Prevention, Care, Newborn, Newborn, Childbirth.

Prevención y cuidado de los recién nacidos durante el parto

Vol. 3, núm. 4., (2019)

Cristhian Fabricio Sancan Zambrano; Nieve Geomara García Palacios; María Angélica Mendoza Intriago; Juan Carlos Saltos Zambrano; Angélica María Tumbaco Tumbaco; Dolly Natasha Ross Mera

Introducción.

El nacimiento de un niño es el acontecimiento más importante en la vida de una mujer y en general, para el mundo ya que representa la reproducción de la especie humana. Tan especial acontecimiento, casi siempre, es un proceso espontáneo y sin complicaciones, no obstante, existen casos en donde algunas circunstancias (factores de riesgo de la madre, propios de la condición del feto, del medio ambiente, de los cuidados y atención médica proporcionada antes, durante, en el momento y después del parto) que pueden poner en riesgo la salud y la vida de la madre y del recién nacido. En tal sentido, es importante destacar, que en todo el mundo la mortalidad neonatal representa uno de los principales problemas de salud pública, en contra del cual son cada vez más los esfuerzos aunados tanto por organizaciones internacionales y nacionales del área de la salud, gobiernos, interesados y particulares, con la finalidad de mejorar el proceso de embarazo de la mujer, la atención y cuidado de esta y del recién nacido.

Como ya se mencionó, el parto en general sucede sin problemas, sin embargo, en ocasiones pueden presentarse algunas complicaciones que acarrean riesgos para la madre, el bebé o ambos. Las complicaciones que pueden presentarse incluyen:

- Parto prematuro, cuando el trabajo de parto comienza antes de las 37 semanas completas de embarazo.
- Problemas con el cordón umbilical.
- Problemas con la posición del bebé, por ejemplo, cuando está de nalgas, en la que los pies del bebé saldrían antes que su cabeza.
- Lesión al nacer. (Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano, Eunice Kennedy Shriver, 2019)

Dada la importancia de la mortalidad neonatal como una de las principales consecuencias de las complicaciones del parto, cabe destacar que el riesgo de muerte del niño es mayor durante el este periodo (los primeros 28 días de vida). En materia de prevención de la mortalidad neonatal es fundamental asegurar un parto seguro y cuidados neonatales eficaces. Con respecto a las cifras se estima que en 2016 murieron 2,6 millones de niños en su primer mes de vida. “Cada día mueren

Prevención y cuidado de los recién nacidos durante el parto

Vol. 3, núm. 4., (2019)

Cristhian Fabricio Sancan Zambrano; Nieve Geomara García Palacios; María Angélica Mendoza Intriago; Juan Carlos Saltos Zambrano; Angélica María Tumbaco Tumbaco; Dolly Natasha Ross Mera

unos 7000 recién nacidos, lo que significa que el 46% de las muertes de menores de 5 años tienen lugar durante el periodo neonatal”. (Organización Mundial de la Salud - OMS, 2019)

Asimismo, “La mayor parte de las defunciones de recién nacidos (75%) ocurren durante la primera semana de vida, y aproximadamente 1 millón de recién nacidos mueren en las 24 primeras horas de vida”. Por otra parte, cabe destacar que la inmensa mayoría de las defunciones de recién nacidos se producen en países de ingresos bajos y medianos. (OMS, 2019)

Para González, Pérez, Leal, Ruíz, & González (2016) la mayoría de las muertes neonatales pueden ser prevenibles y tratables, en ese sentido los esfuerzos mundiales deben encaminarse no sólo en métodos terapéuticos más eficaces y accesibles en recién nacidos prematuros críticamente enfermos, es importante además prestar especial atención a todo el proceso de embarazo, trabajo de parto y parto. En vista de las notables diferencias en la mortalidad entre naciones con altos recursos y las de recursos limitados, los autores destacan que este tema debe abordarse de manera más eficaz a los fines de procurar un rápido descenso de la mortalidad infantil en todo el mundo. (p. 116)

Siguiendo con los datos estadísticos, la Organización Mundial de la Salud - OMS, UNICEF (2014) refiere que “3 millones de bebés y mujeres podrían salvarse cada año si se invierte en atención de calidad en torno al momento del nacimiento y en atención especial para los recién nacidos enfermos y de pequeño tamaño”. Igualmente, indica que:

Actualmente existen soluciones costo eficaces para proteger a las mujeres y los niños en el día más peligroso de sus vidas: el del nacimiento. El 44% de las muertes fetales, el 73% de las muertes de recién nacidos y el 61% de las muertes maternas se producen en torno al momento del trabajo del parto y el nacimiento y en los primeros días después del nacimiento. En 2012, más del 80% de la mortalidad neonatal se debió a tres causas: las complicaciones de la prematuridad, las muertes neonatales relacionadas con el parto (incluida la asfixia perinatal) y las infecciones neonatales. Las complicaciones de la prematuridad son también la segunda causa de muerte de los menores de cinco años. (p. 2)

Prevención y cuidado de los recién nacidos durante el parto

Vol. 3, núm. 4., (2019)

Cristhian Fabricio Sancan Zambrano; Nieve Geomara García Palacios; María Angélica Mendoza Intriago; Juan Carlos Saltos Zambrano; Angélica María Tumbaco Tumbaco; Dolly Natasha Ross Mera

La presente investigación se enfoca en el tema de la prevención de complicaciones durante el parto y el cuidado del recién nacido en esta etapa. El estudio destaca la parte preventiva por medio de la revisión de los factores de riesgo de las mujeres embarazadas que permiten establecer el control para la mejor salud y supervivencia del recién nacido, así como los cuidados esenciales del recién nacido en el momento del parto para abarcar aquellas complicaciones propias de esta etapa e independientes de los factores de riesgo de la madre.

Materiales y Métodos.

El uso de computadores personales con conexión a internet, fue fundamental para buscar el material digital necesario para la presente investigación, a los fines de exponer acerca de la prevención y el cuidado del recién nacido durante el parto, por lo que se clasifica la presente investigación como un diseño documental o bibliográfico. Asimismo, para la búsqueda y revisión se usaron diversas bases de datos, entre las que figuraron: MedlinePlus, PubMed, Biblioteca Virtual de la Salud (BVS), SciELO, Dialnet, Manuales MSD, Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, entre otras. En cuanto a los descriptores se usaron: “prevención de complicaciones en el parto”, “prevención de complicaciones y cuidados del recién nacido”; “cuidados del recién nacido en el momento del parto” y “manuales de cuidados de recién nacidos en el parto”, lo que aproximadamente resultó en más de un centenar de miles de registros bibliográficos, filtrados bajo criterios de idioma español, correlación temática, relevancia y fecha de publicación en los últimos cinco años.

Resultados.

Prevención de complicaciones en el momento del parto.

En cuanto a la prevención de complicaciones en el momento del parto que puedan poner en peligro la salud y la vida del recién nacido, es importante mencionar los factores de riesgo que propician estas complicaciones a los fines de enfocar el tratamiento preventivo a la prevención misma de estos factores.

Prevención y cuidado de los recién nacidos durante el parto

Vol. 3, núm. 4., (2019)

Cristhian Fabricio Sancan Zambrano; Nieve Geomara García Palacios; María Angélica Mendoza Intriago; Juan Carlos Saltos Zambrano; Angélica María Tumbaco Tumbaco; Dolly Natasha Ross Mera

Los factores que generan riesgo para el embarazo y, por ende, podrían repercutir en la salud y supervivencia del recién nacido durante el parto, se pueden dividir en cuatro categorías:

- Problemas de salud existentes: Entre estos se pueden destacar la presión arterial alta, la cual, si bien puede ser riesgosa para la madre y el feto, muchas mujeres con presión arterial alta tienen embarazos e hijos saludables. La presión arterial alta no controlada, sin embargo, puede provocar daño en los riñones de la madre y aumentar el riesgo de tener preeclampsia o un bebé con peso bajo. Síndrome del ovario poliquístico: es un trastorno que puede interferir en la capacidad de una mujer de quedar embarazada y mantener el embarazo. Diabetes: los niveles altos de azúcar en la sangre pueden provocar defectos de nacimiento durante las primeras semanas de embarazo, con frecuencia incluso antes de que la mujer sepa que está embarazada. Obesidad: puede tornar más difícil un embarazo, al aumentar la probabilidad de que una mujer desarrolle diabetes durante el embarazo, lo que contribuye a los partos difíciles. Por otro lado, algunas mujeres pesan demasiado poco para su propia salud y la salud del feto en desarrollo. El VIH/SIDA. El VIH/SIDA daña las células del sistema inmunitario, lo que les dificulta combatir las infecciones y determinados cánceres. Las mujeres pueden transmitir el virus al feto durante el embarazo; la transmisión también puede darse durante el trabajo de parto y el parto, o a través de la leche materna.
- Edad: Existen factores de riesgo relacionados con la edad tales como embarazo adolescente, la mujer embarazada en esta edad es más propensa a desarrollar presión arterial alta y anemia y comenzar el trabajo de parto antes que las mujeres de más edad. Primer embarazo después de los 35 años: las madres primerizas de más edad pueden tener embarazos normales, pero las investigaciones indican que estas mujeres corren más riesgo de tener: un parto por cesárea, complicaciones en el parto, trabajo de parto prolongado, entre otros.
- Factores del estilo de vida, tales como el consumo de alcohol, el cual durante el embarazo pasa directamente al feto a través del cordón umbilical. Consumo de cigarrillos: fumar durante el embarazo aumenta el riesgo del feto de tener un parto prematuro, determinados defectos de nacimiento y el síndrome de muerte súbita del lactante.

Prevención y cuidado de los recién nacidos durante el parto

Vol. 3, núm. 4., (2019)

Cristhian Fabricio Sancan Zambrano; Nieve Geomara García Palacios; María Angélica Mendoza Intriago; Juan Carlos Saltos Zambrano; Angélica María Tumbaco Tumbaco; Dolly Natasha Ross Mera

-
- Condiciones del embarazo, tales como el embarazo múltiple, sean mellizos, trillizos o más fetos, conocidos como embarazos múltiples, aumentan el riesgo de los bebés de nacer prematuros. Diabetes gestacional: La diabetes gestacional no controlada aumenta el riesgo de tener un trabajo de parto y un parto prematuros, preeclampsia y presión arterial alta. Preeclampsia y eclampsia: Si no se trata, la enfermedad puede ser mortal para la madre y/o el feto y causar problemas de salud a largo plazo. (Instituto Nacional de la Salud Infantil y Desarrollo Humano Eunice Kennedy Shriver, 2018)

En tal sentido, el diagnóstico y tratamiento de estos factores de riesgo, así como adoptar un estilo de vida sano, entre otros, permitirá aumentar las probabilidades de un parto sin complicaciones y un recién nacido saludable y sin riesgo de muerte relacionado con el parto.

Cuidado del recién nacido durante el parto.

El cuidado que se brinde al recién nacido en el momento del parto, es fundamental para aumentar las probabilidades de una buena salud y de vida. Existen casos en los que la sola prevención de los factores de riesgo durante el embarazo no es suficiente, ya que pueden presentarse complicaciones propias del momento del parto.

Al respecto, la OMS indica que la mayoría de los aproximadamente 140 millones de nacimientos que ocurren en todo el mundo cada año se dan en mujeres ausentes de factores de riesgo de complicaciones del parto. “No obstante, el momento del parto es crítico para la sobrevivencia de las mujeres y los bebés, ya que el riesgo de morbilidad puede aumentar considerablemente si surgen complicaciones”. (Organización Panamericana de la Salud, 2019)

En este orden de ideas, la OMS (2018) publicó 56 recomendaciones para los cuidados durante el parto: 26 son recomendaciones nuevas y 30 son recomendaciones incorporadas a partir de las directrices existentes de la OMS, las cuales sirven como base internacional para el desarrollo de cualquier guía o manual en la atención y cuidados tanto de la madre como del recién nacido en el momento del parto. Al respecto resume el documento:

Prevención y cuidado de los recién nacidos durante el parto

Vol. 3, núm. 4., (2019)

Cristhian Fabricio Sancan Zambrano; Nieve Geomara García Palacios; María Angélica Mendoza Intriago; Juan Carlos Saltos Zambrano; Angélica María Tumbaco Tumbaco; Dolly Natasha Ross Mera

Las recomendaciones se presentan de acuerdo con el contexto de cuidados durante el parto para el cual son relevantes, es decir, la atención durante todo el trabajo de parto y el parto, durante el período de dilatación, durante el período expulsivo, durante el alumbramiento, la atención inmediata del recién nacido (ver tabla 1) y la atención inmediata de la mujer después del parto. De acuerdo a las evaluaciones de los criterios EtD de GRADE, los cuales informaron la dirección y, en algunos casos, el contexto específico de la recomendación, el GDG clasificó cada recomendación en una de las siguientes categorías que se definen a continuación: Recomendado: esta categoría indica que la intervención u opción se deberían implementar. No recomendado: esta categoría indica que la intervención u opción no se deberían implementar. Recomendado solo en contextos específicos: esta categoría indica que la intervención u opción se aplica solo a la condición, entorno o población que se especifican en la recomendación, y se deberían implementar en estos contextos únicamente. Recomendado solo en el contexto de investigaciones rigurosas: esta categoría indica que existen dudas importantes con respecto a la intervención u opción. En estos casos, la implementación se puede llevar a cabo a gran escala, siempre y cuando adopte en forma de investigación capaz de abordar las preguntas y dudas sin respuesta relacionadas tanto con la efectividad de la intervención u opción como con su aceptabilidad y viabilidad. (p. 2, 3)

Tabla 1

Resumen de recomendaciones para los cuidados durante el parto para una experiencia de parto positiva. Atención del recién nacido.

Opción de atención	Recomendación	Categoría de la recomendación
Aspiración nasal u oral de rutina	47. En neonatos nacidos con líquido amniótico claro que comienzan a respirar por su propia cuenta al nacer, no se debe realizar la aspiración de la boca y la nariz.	No recomendado
Contacto piel con piel	48. Se debe mantener a los recién nacidos sin complicaciones en contacto piel con piel (CPP) con sus madres durante la primera hora después del nacimiento para prevenir la hipotermia y promover la lactancia.	Recomendado

Prevención y cuidado de los recién nacidos durante el parto

Vol. 3, núm. 4., (2019)

Cristhian Fabricio Sancan Zambrano; Nieve Geomara García Palacios; María Angélica Mendoza Intriago; Juan Carlos Saltos Zambrano; Angélica María Tumbaco Tumbaco; Dolly Natasha Ross Mera

Lactancia	49. Todos los recién nacidos, incluso los bebés con bajo peso al nacer (BPN) que pueden amamantarse, se deben colocar al pecho tan pronto como sea posible después del nacimiento tras corroborar la estabilidad clínica, y en tanto la madre y el bebé estén listos.	Recomendado
Vitamina K como profilaxis para la enfermedad hemorrágica	50. Se debe administrar a todos los recién nacidos 1 mg de vitamina K por vía intramuscular después del nacimiento (es decir, después de la primera hora en la cual el lactante debería estar en contacto piel con piel con la madre e iniciada la lactancia)	Recomendado

Nota: Recuperado de: " Recomendaciones de la OMS Para los cuidados durante el parto, para una experiencia de parto positiva". Organización Mundial de la Salud (2018). Recuperado de: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272435/WHO-RHR-18.12-spa.pdf?ua=1>

López García (2018) al respecto refiere en su estudio que un adecuado Plan de Cuidados de Enfermería al Recién Nacido en la Sala de Partos deberá ir encaminado a “secar, estimular y reposicionar, colocar piel con piel con la madre si es posible, cuidados del cordón umbilical y la placenta”. De lo anterior resume “Secar, estimular y reposicionar”:

Para evitar pérdida de calor recomienda el uso de fuente de calor radiante, mantas térmicas o toallas secas, se debe cubrir la cabeza del recién nacido con gorro improvisado con toallas o paños. Asimismo, se debe optimizar la vía aérea usando posición correcta (posición neutra o en ligera extensión) y aspiración si fuera necesario. Para la aspiración, primero boca/faringe y después nariz, la succión debe ser con suavidad, no superar los 5 segundos. (p. 23)

En cuanto a la recomendación internacional de mantener al recién nacido en contacto piel con piel de sus padres, se puede destacar de este método, también llamado "Método Madre Canguro", que fue creado por un neonatólogo colombiano, Dr. Édgar Rey Sanabria en el año 1.978 y consiste en mantener caliente al bebé prematuro, colaborando con el alta hospitalaria. Para el desarrollo del método se instruye a las madres para que sostengan a los bebés vestidos solo con pañal por debajo de su vestuario, es decir, poner al bebé su piel en contacto con la piel de la madre. Es importante

Prevención y cuidado de los recién nacidos durante el parto

Vol. 3, núm. 4., (2019)

Cristhian Fabricio Sancan Zambrano; Nieve Geomara García Palacios; María Angélica Mendoza Intriago; Juan Carlos Saltos Zambrano; Angélica María Tumbaco Tumbaco; Dolly Natasha Ross Mera

destacar que el método a pesar de estar desarrollado para los recién nacidos prematuros, también nace de la necesidad de la carencia de incubadoras en países menos desarrollados. Entre los beneficios se tiene la cercanía y comodidad especial para ambos (madre-bebé o padre-bebé), igualmente brinda momentos especiales de pertenencia, que solo pueden experimentar los padres y el recién nacido. (American Academy of Pediatrics, 2019)

Entre otros beneficios tenemos la estabilización de la temperatura corporal y otros parámetros vitales del recién nacido, favorece su crecimiento y desarrollo (en el caso de prematuridad), reduce los lapsos de hospitalización y propicia el vínculo madre/padre/hijo.

Conclusión.

La prevención de las complicaciones durante el parto permite disminuir los índices de morbimortalidad tanto de la madre como del recién nacido. En este sentido el diagnóstico y tratamiento de los factores de riesgo durante el embarazo son fundamentales para aumentar las probabilidades de un parto seguro para ambos.

Existen complicaciones propias del momento del parto e independientes de los factores de riesgo que pueden detectarse durante el embarazo y que pueden poner en riesgo la salud y la vida del recién nacido. En este orden de ideas es fundamental prestar los cuidados esenciales al recién nacido durante el parto que eviten estas complicaciones y garanticen su bienestar.

Por último, es vital para la reducción de los índices de mortalidad de recién nacidos hacer énfasis el desarrollo de políticas de salud y protocolos clínicos a nivel nacional y local, basados en las recomendaciones internacionales y diferentes orientaciones de las organizaciones mundiales del área de la salud. Asimismo, se requiere implementar y administrar programas de salud maternos e infantiles, en los diferentes centros de salud que permitan brindar el bienestar tanto de la madre como del recién nacido en todo el proceso de embarazo, parto y post parto. Resulta imperioso garantizar el acceso a una atención médica digna a las mujeres embarazadas de todo el mundo y atacar el problema de salud de la morbimortalidad materna y neonatal.

Prevención y cuidado de los recién nacidos durante el parto

Vol. 3, núm. 4., (2019)

Cristhian Fabricio Sancan Zambrano; Nieve Geomara García Palacios; María Angélica Mendoza Intriago; Juan Carlos Saltos Zambrano; Angélica María Tumbaco Tumbaco; Dolly Natasha Ross Mera

Bibliografía.

American Academy of Pediatrics. (12 de Noviembre de 2019). *HealthyChildren.org*. Recuperado el 03 de Enero de 2020, de <https://www.healthychildren.org/spanish/ages-stages/baby/preemie/paginas/about-skin-to-skin-care.aspx>

González, D. M., Pérez, G., Leal, J. C., Ruíz, R. A., & González, J. d. (2016). Tendencia y causas de mortalidad neonatal en el Instituto. *Revista Mexicana de Pediatría*, 83(4), 115-123. Recuperado el 14 de Enero de 2020, de <https://www.medigraphic.com/pdfs/pediat/sp-2016/sp164c.pdf>

Instituto Nacional de la Salud Infantil y Desarrollo Humano Eunice Kennedy Shriver . (26 de Noviembre de 2018). *Instituto Nacional de la Salud Infantil y Desarrollo Humano Eunice Kennedy Shriver* . (I. N. Unidos, Editor) Recuperado el 25 de Enero de 2020, de <https://espanol.nichd.nih.gov/salud/temas/high-risk/informacion/factores>

Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano, Eunice Kennedy Shriver. (25 de Junio de 2019). *Medlineplus*. Recuperado el 08 de Febrero de 2020, de <https://medlineplus.gov/spanish/childbirthproblems.html>

López García, E. P. (2018). Cuidados del Recién Nacido en la Sala de Partos. *Revista Pediatría Electrónica*, 15(1), 21-25. Recuperado el 30 de Enero de 2020, de <http://www.revistapediatria.cl/volumenes/2018/vol15num1/pdf/CUIDADOS%20DEL%20RECIEN%20NACIDO%20EN%20LA%20SALA%20DE%20PARTOS.pdf>

OMS. (19 de Septiembre de 2019). *Organización Mundial de la Salud*. Recuperado el 05 de enero de 2020, de <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/newborns-reducing-mortality>

Organización Mundial de la Salud - OMS. (19 de Septiembre de 2019). *Organización Mundial de la Salud*. Recuperado el 06 de Enero de 2020, de <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/children-reducing-mortality>

Prevención y cuidado de los recién nacidos durante el parto

Vol. 3, núm. 4., (2019)

Cristhian Fabricio Sancan Zambrano; Nieve Geomara García Palacios; María Angélica Mendoza Intriago; Juan Carlos Saltos Zambrano; Angélica María Tumbaco Tumbaco; Dolly Natasha Ross Mera

Organización Mundial de la Salud - OMS, UNICEF. (2014). *Organización Mundial de la Salud*. Recuperado el 20 de Enero de 2020, de https://www.who.int/pmnch/about/governance/partnersforum/enap_exesummary_es.pdf

Organización Mundial de la Salud. (2018). *Organización Mundial de la Salud*. Recuperado el 08 de Febrero de 2020, de <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272435/WHO-RHR-18.12-spa.pdf?ua=1>

Organización Panamericana de la Salud. (18 de Septiembre de 2019). *Organización Panamericana de la Salud*. Recuperado el 20 de Enero de 2020, de <http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/51552>



**RECONOCIMIENTO-NOCOMERCIAL-COMPARTIRIGUAL
CC BY-NC-SA**

ESTA LICENCIA PERMITE A OTROS ENTREMEXCLAR, AJUSTAR Y CONSTRUIR A PARTIR DE SU OBRA CON FINES NO COMERCIALES, SIEMPRE Y CUANDO LE RECONOZCAN LA AUTORÍA Y SUS NUEVAS CREACIONES ESTÉN BAJO UNA LICENCIA CON LOS MISMOS TÉRMINOS.